

## **VÝSADBA A OŠETŘOVÁNÍ JEHLIČNANŮ A NEOPADAVÝCH STÁLEZELENÝCH LISTNÁČŮ**

U těchto druhů je nutná výsadba i s balem proto, že tyto dřeviny vypařují vodu i v zimním období.

**Doba výsadby:** je dobrá brzká podzimní výsadba. Protože rostliny stačí do zimy vytvořit první kořínky. Vysazovat však můžeme až do začátku rašení, to znamená do března.

**Výsadba:** Vlastní výsadbu provádíme do připravených jam, které zasypeme do potřebné výšky zeminou s přídavkem rašeliny a na ní postavíme kořenový bal. Pro keře volíme velikost jámy 50x50x50, u stromů 70x70x70. Jámy hloubíme rýčem, u rozsáhlých výsadeb můžeme použít mechanizační techniku (půdní vrtáky). Hloubka výsadby má odpovídat hloubce, jak byly rostliny vysázeny ve školce. Uvolníme obal, který rozprostřeme v jámě, po uvolnění bal zasypeme ornicí, dokola přišlápneme a důkladně zalijeme.

**Ošetření po výsadbě:** U vyšších stromů zajistíme jejich vyvrácení tím, že k nim zatlučeme kůl, ke kterému dřevinu vyvážeme. Rostlinu také chráníme před okusem zvěří a to buďto obalením pletivem, nebo speciálním nátěrem. V době sucha rostliny pravidelně zaléváme. Také je vhodné okolo kmenu rozsypat mulčovací kůru, která zabraňuje nadměrnému vysychání kořenového balu. V zimních měsících setřásáme opatrně větší nános sněhu z větví, abychom zabránili jejich polámání.

**Řez jehličin a neopadavých listnáčů:** U jehličnanů provádíme řez jen zcela výjimečně a to u těch druhů, které to snášejí jako např.: jalovec, tis, tůje. Řezem

docílíme požadovaného tvaru a většího zahuštění. Během vegetace pak odstraňujeme suché a poškozené větve.

Stálezelené listnáče můžeme dobře tvarovat do živých plotů. Patří sem např. buxus, neopadavý ptačí zob, ilex apod.